

Polipectomia Endoscópica

A polipectomia endoscópica é o procedimento que permite remover pólipos do tubo digestivo (esófago, estômago, intestino delgado ou cólon), através de um endoscópio.

O pólipo é um crescimento anormal de células da mucosa.

Os pólipos, com o tempo, podem desenvolver-se e sofrer transformação maligna.

Os pólipos identificados durante a colonoscopia podem ser removidos através de uma cirurgia endoscópica minimamente invasiva (polipectomia) e posteriormente enviados para análise.



Complicações Pós-Polipectomia


A polipectomia é um procedimento seguro, com um risco baixo de complicações, sendo que, na maioria dos casos, estas eventuais complicações podem ser resolvidas durante o procedimento.

As complicações mais graves da polipectomia são a hemorragia e a perfuração do tubo digestivo que podem obrigar a internamento, transfusões e, muito raramente cirurgia.

Pode ser espectável uma pequena quantidade de sangue nas fezes nos primeiros 3-4 dias após polipectomia;

Pode sentir algum desconforto abdominal devido ao ar insuflado durante o procedimento.

- Uma grande quantidade de perda de sangue pelas fezes ou fezes escuras;
- Dor abdominal forte ou persistente;
- Náuseas ou vômitos persistentes;
- Febre;
- Distensão abdominal.



DEVE DIRIGIR-SE AO HOSPITAL MAIS PROXIMO
E FAZER-SE ACOMPANHAR DO RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO